

## GENÇ ADÖLESAN YAŞLARDA PARANKİMAL HEMATOMUN NADİR NEDENİ ANJİSENTRİK GLİOMA

**Ali Harmanoğullarından, Zeki Boğa**

*Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Adana, Türkiye*

**Amaç:** Bu bildiride, nadir görülen bir anjiosentrik gliom (AG) vakasını ve bu vakadaki klinik bulguları tartışmak hedeflenmiştir.

**Gereç ve Yöntemler:** 16 yaşındaki erkek hasta, baş ağrısı ve şuur değişikliği ile başvurmuş; yapılan görüntülemelerde parankimal hematoma saptanmıştır. İlk olarak DSA uygulanmış, ardından 20 gün sonra tekrar DSA yapılarak vasküler patoloji değerlendirilmiştir. Takip sürecinde hastanın durumu gözlemlenmiş ve gerekli durumlarda ek MR görüntülemeleri yapılmıştır.

**Bulgular:** Hastanın ilk hemoraji sonrası DSA'da patoloji saptanmamış, parankimal hematoma gerilemiş, ancak 9. ayda yeni parankimal hematoma gelişmiştir. Yapılan DSA'da yine patoloji bulunmamış; hastaya medikal tedavi uygulanmıştır. Nörolojik muayenede gerileme gözlemlenince acil operasyon gerçekleştirilmiş ve patoloji sonucu anjiosentrik gliom olarak tespit edilmiştir.

**Sonuç:** Anjiosentrik gliom, genellikle düşük grade'li bir tümör olup, baş ağrısı ya da nöbet ile başvurabilmektedir. Literatürde bu tür vakaların nadir olduğu gösterilmiş ancak mevcut vakamız, parankimal hematoma ile prezente olan ikinci AG vakasıdır. Eğer vasküler patoloji saptanmazsa, bu durumun dikkate alınması gerektiği vurgulanmıştır.

**Anahtar Kelimeler:** Anjiosentrik gliom, parankimal hematoma, düşük grade tümör, DSA.